

A

FACOLTÀ DI FARMACIA – C.d.L. in Farmacia
CORSO DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
COMPITO SCRITTO - 12 Novembre 2014

COGNOME _____ NOME _____

Segnare con una crocetta la risposta (una sola) che si ritiene esatta. Alle risposte esatte verranno assegnati +2 punti mentre a quelle errate -1/2. Alle domande a cui non si risponde verrà assegnato un punteggio nullo. Non è consentita la consultazione di libri o appunti.

1 - La reazione $A + B \rightarrow C + D$ è caratterizzata da un $\Delta H^\circ = 0$ e segue una cinetica del primo ordine rispetto ad A e del secondo ordine rispetto a B. Quale delle seguenti affermazioni è **falsa**?

- A - la velocità raddoppia se si raddoppia la concentrazione iniziale di A
 B - la velocità aumenta se si aumenta la temperatura
 C - la velocità raddoppia se si raddoppia la concentrazione iniziale di B
 D - la velocità aumenta al diminuire dell'energia di attivazione

2 - Per una reazione caratterizzata da:

$$\Delta H < 0 \text{ e } \Delta S > 0$$

La variazione di energia libera è ...

- A - sempre positiva
 B - positiva per $T > (\Delta H / \Delta S)$
 C - negativa per $T > (\Delta H / \Delta S)$
 D - sempre negativa

3 - Si forma **sempre** un legame ionico tra:

- A - metalli alcalini e alogeni
 B - atomi di non metalli
 C - atomi di differente elettronegatività
 D - atomi metallici

4 - Sono presenti **meno** atomi di idrogeno in 100,0 g di:

- A - naftalene, $C_{10}H_8$ (PM=128)
 B - benzene, C_6H_6 (PM=78)
 C - acetilene, C_2H_2 (PM=26)
 D - toluene, C_7H_8 (PM=92)

5 - Facendo reagire 30 g di S(s) con 25 g di O_2 (g) quante moli di triossido di zolfo si formano? (Si consiglia di scrivere e bilanciare la reazione)

- A - 0,47
 B - 0,78
 C - 0,52
 D - 0,94

6 - Quale delle seguenti affermazioni riguardo lo ione NO_3^- è **falsa** ?

- A - è lo ione nitrito
 B - l'azoto ha ibridazione di tipo sp^2

- C - ha geometria trigonale planare
 D - presenta angoli di legame di circa 120°

7 - L'acido cloroacetico, $HC_2H_2ClO_2$, è un acido monoprotico debole con $K_a = 1,4 \times 10^{-3}$. Si prepara una soluzione sciogliendo 0,012 g di acido cloroacetico in 2,5 litri di volume finale. Si calcoli il pH della soluzione.

- A - 6,28
 B - 7,72
 C - 10,4
 D - 3,57

8 - In 2,0 kg di $H_2O(l)$ sono disciolti 368,4 g di etanolo, C_2H_5OH . La temperatura di ebollizione della soluzione ($K_{eb}(H_2O) = 0,512$) sarà pari a

- A - $97,95^\circ C$
 B - $99,18^\circ C$
 C - $100,82^\circ C$
 D - $102,05^\circ C$

9 - Quale è la specie ossidante nella seguente reazione di ossido-riduzione?



- A - Zn
 B - NO_3^-
 C - OH^-
 D - NH_3

10 - Quale è il pH di una soluzione ottenuta sciogliendo 50 g di cloruro di ammonio in 0,25 litri di acqua? L'ammoniaca è una base debole con $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$

- A - 9,66
 B - 4,34
 C - 2,09
 D - 11,9

11 - Un pallone contiene 64 g di O_2 . Un secondo pallone di uguale volume, alla stessa temperatura e pressione, contiene 4 g di un gas incognito. Esso è:

- A - CO_2
 B - He
 C - H_2
 D - H_2S

A


12 – Quale è la percentuale in peso di acido nitrico in una soluzione acquosa di concentrazione 4,0 molale?

- A - 33,5 %
 B - 20,1 %
 C - 47,1 %
 D - 4,0 %

13 - La specie S^{2-} è isoelettronica con:

- A - Ne
 B - Cl^-
 C - F^-
 D - P^+

14 – I composti *A* e *B* sono in equilibrio ad una certa temperatura, secondo la reazione.



A presenta $\Delta H_f^\circ = -100,00 \text{ kJ mol}^{-1}$, mentre *B* presenta $\Delta H_f^\circ = -180,00 \text{ kJ mol}^{-1}$. Cosa avviene aumentando la temperatura?


- A - Aumenta la concentrazione della specie *A*.
 B - Diminuisce la concentrazione della specie *A*.

- C - Le concentrazioni non cambiano.
 D - Entrambe le concentrazioni diminuiscono

15 - Il bromuro di piombo(II) è un sale poco solubile con solubilità pari a 7,90 g/L. Quale è il K_{ps} del bromuro di piombo(II)? Il peso atomico del piombo è 207,2 u.a.

- A- $3,95 \times 10^{-1}$
 B- $4,00 \times 10^{-5}$
 C- $1,20 \times 10^{-8}$
 D- $7,90 \times 10^{-3}$

16 - Data la seguente reazione:



Si determini il volume di ossigeno a 21°C e 0,5 atm che si ottiene dalla reazione di 19,5 g di LiO_2 con acqua in eccesso.

- A - 18,1 litri
 B - 32,2 litri
 C - 36,2 litri
 D - 16,1 litri

Costanti utili

Numero di Avogadro, $N = 6,022 \times 10^{23}$; Costante dei gas, $R = 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$; Costante di Rydberg = $2,180 \times 10^{-18} \text{ J}$ Velocità della luce $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ Costante di Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

Costante di Faraday, $F = 96500 \text{ C/mol}$

IA IIA

IIIA IVA VA VIA VIIA

H 1,008																	He 4,00
Li 6,941	Be 9,012											B 10,81	C 12,01	N 14,01	O 16,00	F 19,00	Ne 20,18
Na 22,99	Mg 24,30											Al 26,98	Si 28,09	P 30,97	S 32,07	Cl 35,45	Ar 39,95
K 39,10	Ca 40,08	Sc	Ti 47,90	V 50,94	Cr 52,00	Mn 54,94	Fe 55,85	Co 58,93	Ni 58,69	Cu 63,55	Zn 65,39	Ga	Ge	As 74,92	Se	Br 79,90	Kr
Rb	Sr 87,62	Y	Zr	Nb	Mo 95,94	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag 107,9	Cd	In 114,8	Sn 118,7	Sb	Te 127,6	I	Xe

B

FACOLTÀ DI FARMACIA – C.d.L. in Farmacia
CORSO DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
COMPITO SCRITTO - 12 Novembre 2014


COGNOME _____ NOME _____

Segnare con una crocetta la risposta (una sola) che si ritiene esatta. Alle risposte esatte verranno assegnati +2 punti mentre a quelle errate -1/2. Alle domande a cui non si risponde verrà assegnato un punteggio nullo. Non è consentita la consultazione di libri o appunti.

1 - Quale delle seguenti affermazioni riguardo lo ione NO_3^- è **falsa** ?

- A - è lo ione nitrato
- B - l'azoto ha ibridazione di tipo sp^2
- C - ha geometria trigonale planare
- D - presenta angoli di legame di circa 109°

2 - Quale è la specie ossidante nella seguente reazione di ossido-riduzione?



- A - H_2O
- B - HAsO_2
- C - H^+
- D - Sn^{2+}

3 - L'acido cloroacetico, $\text{HC}_2\text{H}_2\text{ClO}_2$, è un acido monoprotico debole con $K_a = 1,4 \times 10^{-3}$. Si prepara una soluzione sciogliendo 1,32 g di acido cloroacetico in 1,5 litri di volume finale. Si calcoli il pH della soluzione.

- A - 2,44
- B - 11,6
- C - 6,59
- D - 7,41

4 - Quale è la percentuale in peso di acido nitrico in una soluzione acquosa di concentrazione 8,0 molale?

- A - 33,5 %
- B - 13,6 %
- C - 47,1 %
- D - 8,0 %

5 - Facendo reagire 150 g di $\text{S}(\text{s})$ con 125 g di $\text{O}_2(\text{g})$ quante moli di triossido di zolfo si formano? (Si consiglia di scrivere e bilanciare la reazione)

- A - 2,6
- B - 4,7
- C - 2,3
- D - 7,6

6 - Si forma **sempre** un legame covalente tra:

- A - metalli alcalini e alogeni
- B - atomi di non metalli
- C - atomi di differente elettronegatività
- D - atomi metallici


7 - Un pallone contiene 64 g di O_2 . Un secondo pallone di uguale volume, alla stessa temperatura e pressione, contiene 8 g di un gas incognito. Esso è:

- A - CO_2
- B - He
- C - H_2
- D - H_2S

8 - La specie Al^{3+} è isoelettronica con:

- A - Mg^{2+}
- B - Cl^-
- C - Ga^{3+}
- D - Ga


9 - I composti A e B sono in equilibrio ad una certa temperatura, secondo la reazione.



A presenta $\Delta H_f^\circ = -180,00 \text{ kJ mol}^{-1}$, mentre B presenta $\Delta H_f^\circ = -100,00 \text{ kJ mol}^{-1}$. Cosa avviene aumentando la temperatura?

- A - Aumenta la concentrazione della specie A.
- B - Diminuisce la concentrazione della specie A.
- C - Le concentrazioni non cambiano.
- D - Entrambe le concentrazioni diminuiscono

10 - Data la seguente reazione:



Si determini il volume di ossigeno a 21°C e 0,5 atm che si ottiene dalla reazione di 38,9 g di LiO_2 con acqua in eccesso.

- A - 72,4 litri
- B - 32,2 litri
- C - 36,2 litri
- D - 48,3 litri

11 - Quale è il pH di una soluzione ottenuta sciogliendo 10 g di cloruro di ammonio in 0,5 litri di acqua? L'ammoniaca è una base debole con $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$

- A - 11,4
- B - 2,59
- C - 9,16
- D - 4,84

B

12 - Il cloruro di piombo(II) è un sale poco solubile con solubilità pari a $7,34 \times 10^{-1}$ g/L. Quale è il K_{ps} del cloruro di piombo(II)? Il peso atomico del piombo è 207,2 u.a.

- A- $3,95 \times 10^{-1}$
 B- $1,20 \times 10^{-5}$
 C- $3,20 \times 10^{-8}$
 D- $7,36 \times 10^{-8}$

13 - In 5,0 kg di $H_2O(l)$ sono disciolti 368,4 g di etanolo, C_2H_5OH . La temperatura di ebollizione della soluzione ($K_{eb}(H_2O) = 0,512$) sarà pari a

- A - 96,02 °C
 B - 99,18 °C
 C - 100,82 °C
 D - 104,02 °C

14 - Sono presenti **più** atomi di idrogeno in 100,0 g di:

- A - naftalene, $C_{10}H_8$ (PM=128)
 B - benzene, C_6H_6 (PM=78)
 C - acetilene, C_2H_2 (PM=26)

D - toluene, C_7H_8 (PM=92)

15 - La reazione $A + B \rightarrow C + D$ è caratterizzata da un $\Delta H^\circ = 0$ e segue una cinetica del primo ordine rispetto ad A e del secondo ordine rispetto a B. Quale delle seguenti affermazioni è **falsa**?

- A - la velocità raddoppia se si raddoppia la concentrazione iniziale di A
 B - la velocità aumenta se si aumenta la temperatura
 C - la velocità aumenta di quattro volte se si raddoppia la concentrazione iniziale di B
 D - la velocità aumenta all'aumentare dell'energia di attivazione

16 - Per una reazione caratterizzata da:
 $\Delta H < 0$ e $\Delta S < 0$

La variazione di energia libera è ...

- A - sempre positiva
 B - positiva per $T > (\Delta H/\Delta S)$
 C - negativa per $T > (\Delta H/\Delta S)$
 D - sempre negativa

Costanti utili

Numero di Avogadro, $N = 6,022 \times 10^{23}$; Costante dei gas, $R = 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$; Costante di Rydberg = $2,180 \times 10^{-18} \text{ J}$ Velocità della luce $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ Costante di Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

Costante di Faraday, $F = 96500 \text{ C/mol}$

IA IIA

IIIA IVA VA VIA VIIA

H 1,008																	He 4,00
Li 6,941	Be 9,012											B 10,81	C 12,01	N 14,01	O 16,00	F 19,00	Ne 20,18
Na 22,99	Mg 24,30											Al 26,98	Si 28,09	P 30,97	S 32,07	Cl 35,45	Ar 39,95
K 39,10	Ca 40,08	Sc	Ti 47,90	V	Cr 52,00	Mn 54,94	Fe 55,85	Co 58,93	Ni 58,69	Cu 63,55	Zn 65,39	Ga	Ge	As 74,92	Se	Br 79,90	Kr
Rb	Sr 87,62	Y	Zr	Nb	Mo 95,94	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag 107,9	Cd	In 114,8	Sn 118,7	Sb	Te 127,6	I	Xe

FACOLTÀ DI FARMACIA – C.d.L. in Farmacia
CORSO DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
COMPITO SCRITTO - 12 Novembre 2014

COGNOME _____ NOME _____

Segnare con una crocetta la risposta (una sola) che si ritiene esatta. Alle risposte esatte verranno assegnati +2 punti mentre a quelle errate -1/2. Alle domande a cui non si risponde verrà assegnato un punteggio nullo. Non è consentita la consultazione di libri o appunti.

1 - La specie S^{2-} è isoelettronica con:

- A - Ne
 B - P^+
 C - F^-
 D - Cl^-

2 - Quale è il pH di una soluzione ottenuta sciogliendo 50 g di cloruro di ammonio in 0,25 litri di acqua? L'ammoniaca è una base debole con $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$

- A - 2,09
 B - 9,66
 C - 4,34
 D - 11,9

3 - Sono presenti **meno** atomi di idrogeno in 100,0 g di:

- A - etano, C_2H_4 (PM=28)
 B - benzene, C_6H_6 (PM=78)
 C - propene, C_3H_6 (PM=42)
 D - toluene, C_7H_8 (PM=92)

4 - In 2,0 kg di $H_2O(l)$ sono disciolti 368,4 g di etanolo, C_2H_5OH . La temperatura di ebollizione della soluzione ($K_{eb}(H_2O) = 0,512$) sarà pari a

- A - 100,82 °C
 B - 102,05 °C
 C - 97,95 °C
 D - 99,18 °C


5 - Un pallone contiene 64 g di O_2 . Un secondo pallone di uguale volume, alla stessa temperatura e pressione, contiene 68 g di un gas incognito. Esso è:

- A - CO_2
 B - He
 C - H_2
 D - H_2S

6 - Quale è la percentuale in peso di acido nitrico in una soluzione acquosa di concentrazione 10,0 molale?

- A - 33,5 %
 B - 10,0 %
 C - 47,1 %
 D - 38,6 %

7 - Data la seguente reazione:



Si determini il volume di ossigeno a 21°C e 0,5 atm che si ottiene dalla reazione di 6,50 g di LiO_2 con acqua in eccesso.

- A - 10,7 litri
 B - 6,03 litri
 C - 5,37 litri
 D - 12,1 litri

8 - Quale delle seguenti affermazioni riguardo lo ione NO_3^- è **falsa** ?

- A - è lo ione nitrato
 B - l'azoto ha ibridazione di tipo sp^2
 C - ha geometria trigonale piramidale
 D - presenta angoli di legame di circa 120°

9 - Facendo reagire 60 g di S(s) con 50 g di $O_2(g)$ quante moli di triossido di zolfo si formano? (Si consiglia di scrivere e bilanciare la reazione)

- A - 1,04
 B - 1,84
 C - 0,94
 D - 1,56

10 - Quale è la specie riducente nella seguente reazione di ossido-riduzione?



- A - Zn
 B - NO_3^-
 C - OH^-
 D - NH_3

11 - La reazione $A + B \rightarrow C + D$ è caratterizzata da un $\Delta H^\circ = 0$ e segue una cinetica del primo ordine rispetto ad A e del secondo ordine rispetto a B. Quale delle seguenti affermazioni è **falsa**?

- A - la velocità aumenta di quattro volte se si raddoppia la concentrazione iniziale di A
 B - la velocità aumenta se si aumenta la temperatura
 C - la velocità aumenta di quattro volte se si raddoppia la concentrazione iniziale di B
 D - la velocità aumenta al diminuire dell'energia di attivazione

C

12 - L'acido cloroacetico, $\text{HC}_2\text{H}_2\text{ClO}_2$, è un acido monoprotico debole con $K_a=1,4 \times 10^{-3}$. Si prepara una soluzione sciogliendo 0,012 g di acido cloroacetico in 2,5 litri di volume finale. Si calcoli il pH della soluzione.

- A - 6,28
- B - 7,72
- C - 3,57
- D - 10,4

13 - Il bromuro di piombo(II) è un sale poco solubile con solubilità pari a 7,90 g/L. Quale è il Kps del bromuro di piombo(II)? Il peso atomico del piombo è 207,2 u.a.

- A- $4,00 \times 10^{-5}$
- B- $3,95 \times 10^{-1}$
- C- $1,20 \times 10^{-8}$
- D- $7,90 \times 10^{-3}$

14 - Per una reazione caratterizzata da:

$$\Delta H > 0 \text{ e } \Delta S > 0$$


La variazione di energia libera è ...

- A - sempre positiva
- B - positiva per $T < (\Delta H/\Delta S)$
- C - negativa per $T < (\Delta H/\Delta S)$
- D - sempre negativa

15 - Si forma **sempre** un legame ionico tra:

- A - atomi metallici
- B - atomi di non metalli
- C - atomi di differente elettronegatività
- D - metalli alcalini e alogeni

16 - I composti A e B sono in equilibrio ad una certa temperatura, secondo la reazione.



A presenta $\Delta H_f^\circ = -100,00 \text{ kJ mol}^{-1}$, mentre B presenta $\Delta H_f^\circ = -180,00 \text{ kJ mol}^{-1}$. Cosa avviene aumentando la temperatura?

- A - Entrambe le concentrazioni diminuiscono
- B - Diminuisce la concentrazione della specie A.
- C - Le concentrazioni non cambiano.
- D - Aumenta la concentrazione della specie A

Costanti utili

Numero di Avogadro, $N = 6,022 \times 10^{23}$; Costante dei gas, $R = 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$; Costante di Rydberg = $2,180 \times 10^{-18} \text{ J}$ Velocità della luce $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ Costante di Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

Costante di Faraday, $F = 96500 \text{ C/mol}$

IA IIA

IIIA IVA VA VIA VIIA

H 1,008																	He 4,00
Li 6,941	Be 9,012											B 10,81	C 12,01	N 14,01	O 16,00	F 19,00	Ne 20,18
Na 22,99	Mg 24,30											Al 26,98	Si 28,09	P 30,97	S 32,07	Cl 35,45	Ar 39,95
K 39,10	Ca 40,08	Sc	Ti 47,90	V	Cr 52,00	Mn 54,94	Fe 55,85	Co 58,93	Ni 58,69	Cu 63,55	Zn 65,39	Ga	Ge	As 74,92	Se	Br 79,90	Kr
Rb	Sr 87,62	Y	Zr	Nb	Mo 95,94	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag 107,9	Cd	In 114,8	Sn 118,7	Sb	Te 127,6	I	Xe


D

FACOLTÀ DI FARMACIA – C.d.L. in Farmacia
CORSO DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
COMPITO SCRITTO - 12 Novembre 2014

COGNOME _____ NOME _____

Segnare con una crocetta la risposta (una sola) che si ritiene esatta. Alle risposte esatte verranno assegnati +2 punti mentre a quelle errate -1/2. Alle domande a cui non si risponde verrà assegnato un punteggio nullo. Non è consentita la consultazione di libri o appunti.

1 - Data la seguente reazione:



Si determini il volume di ossigeno a 21°C e 0,5 atm che si ottiene dalla reazione di 13,0 g di LiO₂ con acqua in eccesso.

- A - 10,7 litri
 B - 24,1 litri
 C - 16,1 litri
 D - 12,1 litri

2 - Il cloruro di piombo(II) è un sale poco solubile con solubilità pari a $7,34 \times 10^{-1}$ g/L. Quale è il K_{ps} del cloruro di piombo(II)? Il peso atomico del piombo è 207,2 u.a.

- A - $3,95 \times 10^{-1}$
 B - $1,20 \times 10^{-5}$
 C - $7,36 \times 10^{-8}$
 D - $3,20 \times 10^{-8}$

3 - La reazione $A + B \rightarrow C + D$ è caratterizzata da un $\Delta H^\circ = 0$ e segue una cinetica del primo ordine rispetto ad A e del secondo ordine rispetto a B. Quale delle seguenti affermazioni è **falsa**?

- A - la velocità raddoppia se si raddoppia la concentrazione iniziale di A
 B - la velocità aumenta se si diminuisce la temperatura
 C - la velocità aumenta di quattro volte se si raddoppia la concentrazione iniziale di B
 D - la velocità aumenta al diminuire dell'energia di attivazione

4 - Quale è il pH di una soluzione ottenuta sciogliendo 10 g di cloruro di ammonio in 0,5 litri di acqua? L'ammoniaca è una base debole con $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$

- A - 2,59
 B - 11,4
 C - 4,84
 D - 9,16

5 - In 5,0 kg di H₂O(l) sono disciolti 368,4 g di etanolo, C₂H₅OH. La temperatura di ebollizione della soluzione ($K_{\text{eb}}(\text{H}_2\text{O}) = 0,512$) sarà pari a

- A - 100,82 °C
 B - 104,02 °C


- C - 96,02 °C
 D - 99,18 °C

6 - Per una reazione caratterizzata da:
 $\Delta H > 0$ e $\Delta S < 0$

La variazione di energia libera è ...

- A - sempre positiva
 B - positiva per $T < (\Delta H / \Delta S)$
 C - negativa per $T < (\Delta H / \Delta S)$
 D - sempre negativa

7 - I composti A e B sono in equilibrio ad una certa temperatura, secondo la reazione.



A presenta $\Delta H_f^\circ = -100,00 \text{ kJ mol}^{-1}$, mentre B presenta $\Delta H_f^\circ = -100,00 \text{ kJ mol}^{-1}$. Cosa avviene aumentando la temperatura?

- A - Aumenta la concentrazione della specie A.
 B - Diminuisce la concentrazione della specie A.
 C - Le concentrazioni non cambiano.
 D - Entrambe le concentrazioni diminuiscono

8 - Sono presenti **più** atomi di idrogeno in 100,0 g di:

- A - benzene, C₆H₆ (PM=78)
 B - propene, C₃H₆ (PM=42)
 C - acetilene, C₂H₂ (PM=26)
 D - toluene, C₇H₈ (PM=92)

9 - Un pallone contiene 64 g di O₂. Un secondo pallone di uguale volume, alla stessa temperatura e pressione, contiene 88 g di un gas incognito. Esso è:

- A - CO₂
 B - He
 C - H₂
 D - H₂S

10 - Quale delle seguenti affermazioni riguardo lo ione NO₃⁻ è **falsa** ?


- A - è lo ione nitrato
 B - l'azoto ha ibridazione di tipo sp³
 C - ha geometria trigonale planare
 D - presenta angoli di legame di circa 120°

D

11 - Quale è la percentuale in peso di acido nitrico in una soluzione acquosa di concentrazione 2,0 molale?

- A - 33,5 %
- B - 11,2 %
- C - 47,1 %
- D - 2,0 %

12 - Quale è la specie riducente nella seguente reazione di ossido-riduzione?



- A - H_2O
- B - HAsO_2
- C - H^+
- D - Sn^{2+}

13 - Facendo reagire 300 g di S(s) con 250 g di $\text{O}_2(\text{g})$ quante moli di triossido di zolfo si formano? (Si consiglia di scrivere e bilanciare la reazione)

- A - 9,4
- B - 5,2
- C - 15,2
- D - 4,6

14 - La specie Al^{3+} è isoelettronica con:

- A - Ga
- B - Cl^-
- C - Ga^{3+}
- D - Mg^{2+}

15 - L'acido cloroacetico, $\text{HC}_2\text{H}_2\text{ClO}_2$, è un acido monoprotico debole con $K_a=1,4 \times 10^{-3}$. Si prepara una soluzione sciogliendo 1,32 g di acido cloroacetico in 1,5 litri di volume finale. Si calcoli il pH della soluzione.

- A - 6,59
- B - 11,6
- C - 2,44
- D - 7,41

16 - Si forma **sempre** un legame covalente tra:

- A - metalli alcalini e alogeni
- B - atomi di differente elettronegatività
- C - atomi di non metalli
- D - atomi metallici

Costanti utili

Numero di Avogadro, $N = 6,022 \times 10^{23}$; Costante dei gas, $R = 0,0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$; Costante di Rydberg = $2,180 \times 10^{-18} \text{ J}$ Velocità della luce $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ Costante di Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
 Costante di Faraday, $F = 96500 \text{ C/mol}$

IA IIA

IIIA IVA VA VIA VIIA

H 1,008																He 4,00	
Li 6,941	Be 9,012											B 10,81	C 12,01	N 14,01	O 16,00	F 19,00	Ne 20,18
Na 22,99	Mg 24,30											Al 26,98	Si 28,09	P 30,97	S 32,07	Cl 35,45	Ar 39,95
K 39,10	Ca 40,08	Sc	Ti 47,90	V	Cr 52,00	Mn 54,94	Fe 55,85	Co 58,93	Ni 58,69	Cu 63,55	Zn 65,39	Ga	Ge	As 74,92	Se	Br 79,90	Kr
Rb	Sr 87,62	Y	Zr	Nb	Mo 95,94	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag 107,9	Cd	In 114,8	Sn 118,7	Sb	Te 127,6	I	Xe

